

# ПАМЯТКА ПО БОТОС по вакцинации от Covid-19

24.05.2021

# Вакцина от КВИ и как ее получить



- **Вакцинация проводится** в поликлинике по месту жительства, а также в некоторых частных клиниках, включая ТОО Интертич и ТОО Медикер. В некоторых случаях для проведения вакцинации организовываются передвижные прививочные пункты (например, прививочные пункты в ТРЦ) или выездные прививочные бригады.
- **Вакцинацию проводят в два этапа:** вначале компонентом I, затем, через **45 дней** без учета дня вакцинации - компонентом II. При невозможности проведения вакцинации компонентом II на 45 день допускается проведение вакцинации в течение 90 дней.
- **Завершившим вакцинацию выдается электронный паспорт вакцинации.** Паспорт доступен в мобильном приложении eGov Mobile.
- **Первый иммунный ответ** после вакцинации вырабатывается на 12-14 день после введения первой дозы, но устойчивый иммунитет формируется не ранее чем через **32–56 дней**.

# Вакцина от КВИ и как ее получить

- Перед проведением вакцинации проводится **обязательный опрос и осмотр врача** с измерением температуры тела, сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева.
- После вакцинации все вакцинированные будут находиться в медицинском учреждении под **наблюдением врача** в течении **30 минут** и последующие **3 дня** - под наблюдением участковых врачей по месту жительства.
- Каждому вакцинированному выдается специальная **памятка** с указанием возможных побочных эффектов вакцины и номера телефонов поликлиник, в которые они могут обратиться в случае проявления таких эффектов.



После проведения вакцинации в **первые-вторые сутки** могут развиваться и **должны прекратиться в течение трех последующих дней**:

- непродолжительный гриппоподобный синдром (озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, головная боль)
- местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность),
- реже отмечаются тошнота, снижение аппетита,
- возможно развитие аллергических реакций.

Вакцинации **НЕ ПОДЛЕЖАТ** лица:

- Младше 18 лет.
- Имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам.
- Имеющие гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты.
- Имевшие тяжелые аллергические реакции в анамнезе (когда-либо ранее в своей жизни).
- Беременные и кормящие грудью.
- **Противопоказания для введения компонента II:** тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°C) на введение компонента I вакцины.



Вакцинация должна быть **ПРОВЕДЕНА ПОЗЖЕ**, если:

- У Вас повышенная температура тела (37°C и более).
- У Вас **острое** инфекционное или неинфекционное заболевание (вакцинацию проводят через **2-4 недели** после выздоровления).
- У Вас **обострение** хронического заболевания (вакцинацию проводят **через 2-4 недели** после выздоровления или ремиссии).
- Вы контактировали с больным КВИ (вакцинацию проводят **после завершения срока карантина**).
- Вы **переболели** КВИ (вакцинацию проводят через **6 месяцев** после выздоровления и с учётом оценки состояния перед вакцинацией).
- Вы употребляли алкоголь в течении последних трех дней.

Препарат необходимо **ПРИМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ** при:

- хронических заболеваниях печени и почек;
- сахарном диабете;
- аутоиммунных заболеваниях;
- заболеваниях легких, астме и ХОБЛ;
- тяжелых заболеваниях системы кроветворения;
- эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС;
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
- у пациентов с аллергическими реакциями, атопией, экземой;
- злокачественных новообразованиях.





# HSE

HEALTH SAFETY ENVIRONMENT